



2025

AYÇİÇEĞİ KATALOĞU





Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. A.Ş.

Fransa'da kurulu bulunan Limagrain Europe ve Türkiye'nin en büyük tarım satış kooperatiflerinden ikisi olan Trakya Birlik ve Karadeniz Birlik ortaklığıyla gücüne güç katmış olan Limagrain Tohum; sahibi ve hissedarlarının tamamı çiftçi olan Dünya'nın ilk ve tek tohumculuk firması olarak 40 yılı aşkın zamandır üreticilerimizin her zaman yanında onların desteğiyle daha nice başarılarla imza atmak üzere çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

Şirketimiz LG markası ile tarla bitkileri tohumluklarında hibrid ayçiçeği, hibrid mısır, kanola, buğday ve arpa tohumluklarının bitki ıslahı; ürün geliştirme, tohumluk üretimi, tohumlukların hazırlanması ve satışı konusunda tohumculuğun tüm aşamalarının tek bir şirkette toplanmış ülkemizde faaliyet gösteren ender firmalardan birisidir.

Limagrain Tohum; ülkemizde hibrid ayçiçeği ve mısır tohumluklarının satışında ilk sıralardadır. Avrupa buğdaygiller ve kanola pazarının en önemli lideridir.

Sadece yerel pazarda büyük bir oyuncu değil aynı zamanda yakın coğrafyaya da tohumluk ihracatı yaparak ülkemize döviz kazandırmaktadır. Ekim 2015 'te açılan Karacabey Tohumluk Hazırlama tesisimiz ile başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Fransa, İspanya, Kazakistan'a tohumluk ihracatı gerçekleştirmekteyiz. Kısacası bu ülkelerin ihtiyaçlarının büyük bir kısmı bu topraklarda geliştirilen ve üretilen tohumluklarla sağlanmaktadır.

Tohumculuk sektöründe ülkemize katkı sağlamak, bu konuda öncü olarak tarımla uğraşanları ve uğraşmak isteyenleri cesaretlendirmek arzusundayız.

Hedeflerimiz doğrultusunda özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza, iştiraklerimize, kooperatiflerimize, bayilerimize ve üreticilerimize, başarımızda emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Türkiye genelinde 7 bölgede, 100'den fazla çalışanı ile tarım sektöründe hizmet vermekteyiz.



AYÇİÇEĞİ

Bilimsel Adı: Helianthus Annus

Takım: Asterales

Aile: Asteraceae

Tür: Tek Yıllık

Kökeni: Kuzey ve Orta Amerika

İklim: Ilıman, Karasal ve Bazı Tropikal Bölgeler

Özgüllük: Pozitif Heliotropizm (Güneşin Yönüne Tepki)

Kafa

Taç Yapraklar

Tabla

Çanak Yapraklar


Alternatif Yapraklar

Boğum

Boğum Arası

Gövde

Kazık Kök Sistemi



44% YAĞ

16% PROTEİN

16% SELÜLOZ

16% DİĞER

7% SU

TANE KOMPOZİSYONU

AYÇİÇEĞİ;

Ülkemizin önemli tarım ürünlerinden olan ayçiçeği bitkisinin birçok kullanım alanı vardır.

Başta insan beslenmesi olmak üzere, Endüstri ve Hayvan beslenmesi gibi alanlarda da önemli bir tarım ürünüdür.



AYÇİÇEĞİNİN ÇOKLU KULLANIM ALANLARI



RİSK YÖNETİMİ
Çiftçiye, en zor durumlarda bile en iyi sonuçları ve en iyi marjı elde etmesine yardımcı olacak çözümler.

MİLDİYÖ'YE KARŞI KORUMA
Mevcut mildiyö türlerine karşı etkili bir koruma.



TABLA YAPISI


Yarı yatık tabla, tohum olgunlaşırken kuşların zararlarını azaltmak için ideal bir pozisyonudur. Kuşlar, tabladaki tohumları yemek için rahatça tutunacakları bir yer bulamazlar.

YABANCI OT YÖNETİMİ

Geleneksel yabancı ot yönetim tekniklerine ek olarak, Limagrain, en iyi herbisidlere karşı dirençli CLP ve SX hibritleri sunmaktadır.

AYÇİÇEĞİNDE ÜSTÜN TEKNOLOJİK YENİLİKLER

40 yıldan fazla bir süredir, Limagrain Avrupa, ayçiçeği üzerine sürekli bir yenilik akışı sunmaktadır. Verim artışı, yağ içeriği, erkenlik ve hastalıklara toleransın yanı sıra, Limagrain Avrupa, çeşitlerin performansına odaklanarak, kuraklık ve orobanşa karşı dayanıklılığı güçlendirmektedir. 2005 yılından itibaren LG, Avrupa'daki tüm mikroklimatik ortamlar için uygun yüksek yağ içeriğine sahip (HO) çeşitler de sunmaktadır. Fransa'da, en büyük oleik pazarında 10 yıldır liderdir.




LG'nin en iyi genetiği, zararlı otlara karşı tolerans sağlamak için Clearfield ve GranStar teknolojileri ile birleştirilmiştir. Bu sayede kontrol edilmesi zor yabancı otlara karşı çözüm sunulmakta ve çiftçilere yüksek verimler sağlanmaktadır. Clearfield ve Clearfield Plus teknolojileri, hızlı bir şekilde orobanşa karşı direnç genleri taşıyan SUNEEO adı verilen hibritlere entegre edilmiştir. Limagrain Avrupa'nın taahhüdü, yarının çiftçileri için genetik, teknolojiler ve yenilikler geliştirmeye devam etmektedir.

AYÇİÇEĞİNİN ANA BESİN İHTİYAÇLARI VE TÜKETİM DÖNEMLERİ

PERİYOT

Mart-Nisan

Nisan-Haziran



BBCH

11

18

53

57

AŞAMALAR

Çimlenme

Vejetatif Faz

Çiçek Tomurcuğu Evresi

Çiçek

SU İHTİYACI

160 MM

FOSFOR

İHTİYAÇ DÖNEMİ

AZOT

İHTİYAÇ DÖNEMİ

POTASYUM

İHTİYAÇ DÖNEMİ

BOR

İHTİYAÇ DÖNEMİ

Renkli çizgiler = yüksek tüketim dönemi Mineral stokunu belirlemek ve girdileri tahmin etmek için toprak analizi önerilir.

EKİM

EKİM YOĞUNLUĞU

M² başına 5 ila 7 bitki arasında olup, ekim derinliği 3 ile 4 cm arasında olmalıdır.

GÜBRELEME

Ekim yatağı hazırlanırken 7-9 kg/da azot (N) uygulanır ve eğer toprak fosfor (P) ve/veya potasyum (K) açısından yetersizse, 6 kg/da P₂O₅ ve/veya K₂O eklenir.

VEGATİF GELİŞİM

Acil durum aşaması geçildikten ve yabancı otlar doğru şekilde kontrol edildikten sonra, ayçiçeği hızla büyür ve toprağı gölgeleyecek şekilde gelişir, bu da yabancı otların rekabeti kazanma şansını azaltır. Bu aşamada, ayçiçeği karmaşık bir kök ağı geliştirecektir; çünkü kök, derinlemesine ve yatay olarak toprakta yayılan dallanmış bir fittondur ve geniş toprak yüzeylerini keşfetme yeteneğine sahiptir. Bu karmaşık yapı, ayçiçeğine su stresi dönemlerini atlatma ve toprak kaynaklarını en iyi şekilde kullanma imkânı sağlar.

BITKİSEL GELİŞİM

YABANCI OT KONTROLÜ

Eğer yabancı otlara karşı dirençli ayçiçeği çeşitleri (CLP ve SX) ekilmeye karar verildiyse, bu seçime bağlı olarak kontrol yapılabilir.

ÇİÇEKLENME, SULAMA

Ayçiçeği, özellikle çiçek düğümü aşamasından çiçeklerin solmasına kadar su stresine karşı daha hassastır. Bu nedenle, çiçeklenmeden sonra sadece destekleyici bir sulama ile müdahale edilmesi, tohum bağlamayı ve nihai verimi teşvik edecektir.

Ayçiçeği tohumunun biyolojik döngüsü, çıkıştan sürer. Ayçiçeği, bir yaz bitkisi olup, tohum ekimi aylarıdır, bu dönemde sıcaklıklar 10°C'yi geçmiştir önemli adımlardan biridir. Çünkü eş zamanlı ve kaynaklanan zararları azaltır ve tarlanın verimini artırır.

Haziran-Ağustos

Ağustos-Eylül



61



65



79



92

Çiçeklenme

Fizyolojik Olum-Hasat

80 MM

180 MM

ÇİÇEKLENME

GÜBRELEME

Bu aşamada, yaklaşık 5-7 kg/da saf azot (N) ile ikinci bir azot uygulaması yapılabilir. Azot gübresinde aşırıya kaçmamak önemlidir, çünkü fazla azot bitkinin dengesini bozabilir ve gelişiminde ve dayanıklılığında sorunlara yol açabilir. Başlangıçta yapılan gübrelemenin ardından yabancı otlar kontrol edilebilir.

OLGUNLAŞMA HASAT

Ayçiçeği bitkisi, döllenme tamamlandıktan sonra başını aşağıya doğru eğerek ve tohumlar nem kaybetmeye başlar, bitki kuruma eğilimindedir. Ayçiçeği hasadı, tohum nem oranı %15'in altına düştüğünde yapılabilir ve ideal nem oranı %11 ile %9 arasında olmalıdır. Nem oranı %8'in altına düşerse, biçim sırasında tohum kaybetme riski artar. Hasat sonrası nem yönetimi önemlidir; nem oranı %9'un altına düşürülmeli, bu da mikroorganizmaların gelişimini ve yağ değişim süreçlerini önler.

Mükemmel kafa yapısına sahip ayçiçekleri kullanmak, başların olgunlaşırken kuş saldırılarını engellemeye yardımcı olur. Hasat makinelerinin ayarlarını doğru yapmak, ayçiçeği yetiştiriciliği için gerekli yüksek teknik bilgiyi tamamlar.

UYGUN HASAT ZAMANININ BELİRLENMESİ



• LG 50.480

• LG 50.550 CLP

• LG 50.501 CLP

• TUNCA

• LG 59.580

• LG 50.489 SX

AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDA 40 Y

• LG 50.689 SX

• LG 50.521 CLP

• LG 5485

• LG 50.455 CLP

• LG 50.585

• LG 50.635 CLP

• LG 50.559 SX

• LG 50.621

• LG 5542 CL

YILDIR YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Limagrain 

ZOR OTLARIN KONTROL ETKİNLİĞİ (KLASİK HERBİSİTLER HARIÇ)

Herbisit Teknolojisi	Clearfield/ Clearfield Plus	Express	Express Gold/ Evorelle Express
Hibrit tipi	CL/CLP	SX	SX
Aktif Madde	Imazamox/ Imazapir	Tribenuron	Tribenuron +Thifensulfuron
Orobanş (parazit)			
Zargan	*	*	
Pire Otu	*	*	
Domuz dibigiller			
Kızılcağız otu	*	*	
Yalancı pancar	*	*	
Kara patates			
Isırgan otu		*	
Jüt otu			
Semizotu			
Şeytan bıyığı	*	*	
Otlar	*		

*İlaçlamadan en iyi performansın alınması için Ayçiçeği bitkisinin 4-8 yaprak aralığında olduğu dönemde ilaçlama yapılması önerilir.

LG TOHUM ÇEŞİTLERİNİN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ



HASTALIK VE OROBANŞA KARŞI
YÜKSEK GENETİK TOLERANS



YÜKSEK VERİM VE YAĞ ORANI



YÜKSEK SICAKLIK VE KURAKLIĞA
YÜKSEK GENETİK TOLERANS



LG TOHUM AYÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİ

GRANSTAR® (SX)



LG 50.559 SX



LG 50.689 SX



LG 50.489 SX



LG 59.580

YENİ!

CLP



Clearfield[®] Plus
Production System



LG 50.501 CLP



LG 50.521 CLP



LG 50.550 CLP



LG 50.635 CLP



LG 50.455 CLP

OR

SUNEO[®]
Technology for Field Protection



LG 50.585



LG 50.621

YENİ!



TUNCA



LG 50.480



LG 5485

OR-X

OR7



OR SEGMENTİ AYÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİ




LG 50.585

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ✿ Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) ve yeni görülen ırklarına (>G) yüksek toleranslıdır.
- ✿ Bilinen ve yeni ırklara yüksek toleransı sayesinde orobanş otu problemi olan her yerde rahatlıkla ekilebilir.
- ✿ Köse (Mildiyö) hastalığına toleranslıdır.
- ✿ Çok yüksek verim potansiyeline sahiptir.
- ✿ Hektolitreye ağırlığı yüksek olması nedeniyle römorktaki ağırlığı fazladır.
- ✿ Yağ oranı yüksektir. Bu özelliğinden dolayı yağ işletmeleri tarafından tercih edilmektedir.
- ✿ Orta boylu, sağlam gövdelidir.
- ✿ Erken bir çeşittir.
- ✿ Kuraklığa yüksek seviyede toleranslıdır.
- ✿ Ortasına kadar dane doldurabilen büyük tabla yapısına sahiptir.
- ✿ Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
- ✿ Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
- ✿ Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.



Boy (cm)

Kısa Boylu



Olum Süresi

Erken



Yağ Oranı

Yüksek




LG 50.621

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ☀ Çok yüksek verim ve yağ oranına sahiptir.
- ☀ Orta erkenci bir çeşittir.
- ☀ Orta boyu ve güçlü kök sistemiyle yatmaya ve kurak koşullara dayanımı yüksektir. Köse(Mildiyö) hastalığına yüksek toleranslıdır.
- ☀ Orobanş otunun(Orabahance spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek toleranslıdır.
- ☀ Tablasının ortasına kadar dane doldurma özelliğine sahiptir.
- ☀ Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
- ☀ Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir. Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.



Boy (cm)

Orta Boylu



Olum Süresi

Erkenci



Yağ Oranı

Yüksek




LG 50.480

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ☀ Çok yüksek verim ve yağ oranına sahiptir.
- ☀ Orta erkenci bir çeşittir.
- ☀ Kısa boyu ve güçlü kök sistemiyle yatmaya ve kurak koşullara dayanımı yüksektir.
- ☀ Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek toleranslıdır.
- ☀ Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek toleranslıdır.
- ☀ Tablasının ortasına kadar dane doldurma özelliğine sahiptir.
- ☀ Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
- ☀ Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
- ☀ Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.
- ☀ Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.



Boy (cm)

Orta Boylu



Olum Süresi

Erkenci



Yağ Oranı

Çok Yüksek




LG 5485

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ☀ Çok yüksek verimlidir.
- Erkenci bir çeşittir.
- ☀ Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
- ☀ Köse (Mildiyö) hastalığına toleranslıdır.
- ☀ Hektolitreye ağırlığı ve yağ oranı yüksektir. Bu özelliğinden dolayı yağ işletmeleri tarafından tercih edilmektedir.
- ☀ Güçlü kök sistemi sayesinde kuraklığa toleransı yüksektir.
- ☀ Orta boylu ve sağlam gövdelidir.
- ☀ Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
- ☀ Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
- ☀ Toprakta çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.
- ☀ Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.



Boy (cm)

Orta Boylu



Olum Süresi

Erkenci



Yağ Oranı

Yüksek




TUNCA

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ☀ Çok yüksek verimlidir. Orta erkenci bir çeşittir.
- ☀ Orobanş otunun (*Orobanche spp.*) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
- ☀ Köse (Mildiyö) hastalığına toleranslıdır.
- ☀ Hektolitreye ağırlığı ve yağ oranı yüksektir. Bu özelliğinden dolayı yağ işletmeleri tarafından tercih edilmektedir.
- ☀ Güçlü kök sistemi sayesinde kuraklığa toleransı yüksektir. Orta boylu ve sağlam gövdelidir.
- ☀ Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
- ☀ Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
- ☀ Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.



Boy (cm)

Orta Boylu



Olum Süresi

Orta Erkenci



Yağ Oranı

Çok Yüksek



**CLP SEGMENTİ
AYÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİ**




LG 50.550 CLP

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Clearfield Plus teknolojisine uygun hibrid ayçiçeği çeşididir.
- İlaçlama sonrasında olumsuz etki görülmez.
- Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
- Yüksek verim ve yağ oranına sahiptir.
- Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek toleranslıdır.
- Orta erkenci bir çeşittir.
- Kurağa karşı yüksek toleranslıdır.
- Sağlam gövdeli, yatmaya karşı yüksek toleranslıdır.
- Tablası güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlayacak şekilde eğiktir.
- Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
- Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.



Boy (cm)

Orta Boylu



Olum Süresi

Orta Erkenci



Yağ Oranı

Orta



LG 50.501 CLP


Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Clearfield Plus teknolojisine uygun hibrid ayçiçeği çeşididir.
- İlaçlama sonrasında olumsuz etki görülmez.
- Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
- Orobanş otuna yüksek toleransı sayesinde ilaçlama sadece tarladaki yabancı ot popülasyonuna göre yapılır.
- Yüksek verim ve yağ oranına sahiptir.
- Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek toleranslıdır.
- Orta erkenci bir çeşittir.
- Kurağa karşı yüksek toleranslıdır.
- Sağlam gövdeli, yatmaya karşı yüksek toleranslıdır.
- Tablası güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlayacak şekilde eğiktir.
- Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
- Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.



DAHA YENİ ÜSTÜN



Boy (cm)

Orta Boylu



Olum Süresi

Orta Erkenci



Yağ Oranı

Orta




LG 50.521 CLP

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ☀ Clearfield Plus teknolojisine uygun hibrid ayçiçeği çeşididir.
- ☀ İlaçlama sonrasında olumsuz etki görülmez.
- ☀ Yüksek verim ve yağ oranı sayesinde üreticilerimizin beğenisini kazanacak bir çeşittir.
- ☀ Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
- ☀ Köse (Mildiyö) hastalığına toleranslıdır.
- ☀ Orta erkenci bir çeşittir.
- ☀ Kurağa karşı yüksek toleranslıdır.
- ☀ Sağlam gövdeli, yatmaya karşı yüksek toleranslıdır.
- ☀ Ortasına kadar dane doldurabilen büyük tabla yapısına sahiptir.
- ☀ Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
- ☀ Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
- ☀ Toprakta çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.



Boy (cm)

Orta Boylu



Olum Süresi

Erkenci



Yağ Oranı

Yüksek




LG 50.455 CLP

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Clearfield Plus teknolojisine uygun hibrid ayçiçeği çeşididir.
- İlaçlama sonrasında olumsuz etki görülmez.
- Yüksek verim ve yağ oranı sayesinde üreticilerimizin beğenisini kazanacak bir çeşittir.
- Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
- Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek toleranslıdır.
- Erkenci bir çeşittir.
- Kurağa karşı yüksek toleranslıdır.
- Sağlam gövdeli, yatmaya karşı yüksek toleranslıdır.
- Ortasına kadar dane doldurabilen büyük tabla yapısına sahiptir.
- Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
- Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
- Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.



Boy (cm)

Orta Boylu



Olum Süresi

Erkenci



Yağ Oranı

Yüksek




LG 50.635 CLP

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Clearfield Plus teknolojisine uygun hibrid ayçiçeği çeşididir.
- İlaçlama sonrasında olumsuz etki görülmez.
- Orobanş otunun (*Orobanche* spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
- Orobanş otuna yüksek toleransı sayesinde ilaçlama sadece tarladaki yabancı ot popülasyonuna göre yapılır.
- Verimi ve yağ oranı yüksektir.
- Köse (Mildiyö) hastalığına toleranslıdır.
- Orta erkenci bir çeşittir.
- Kurağa karşı yüksek toleranslıdır.
- Sağlam gövdeli, yatmaya karşı yüksek toleranslıdır.
- Ortasına kadar dane doldurabilen büyük tabla yapısına sahiptir.
- Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
- Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.



Boy (cm)

Kısa Boylu



Olum Süresi

Orta Erkenci



Yağ Oranı

Yüksek



**GRANSTAR(SX) SEGMENTİ
AYÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİ**




LG 59.580 SX

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ✿ GRANSTAR® herbisitine uygun olarak geliştirilmiştir. Çok yüksek verim potansiyeline sahiptir.
- ✿ Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
- ✿ Köse (Mildiyö) hastalığına toleranslıdır.
- ✿ Kurağa karşı yüksek oranda toleranslıdır.
- ✿ Erken bir çeşittir.
- ✿ Orta boylu, sağlam gövdeli, yatmaya karşı yüksek toleranslıdır.
- ✿ Hektolitreye ağırlığı yüksek olması nedeniyle römorktaki ağırlığı fazladır.
- ✿ Ortasına kadar dane doldurabilen büyük tabla yapısına sahiptir.
- ✿ Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.



Boy (cm)

Orta Boylu



Olum Süresi

Orta Erken



Yağ Oranı

Orta




LG 50.689 SX

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ✿ GRANSTAR® herbisitine uygun olarak geliştirilmiştir.
- ✿ Çok yüksek yağ oranı ve yüksek verime sahiptir.
- ✿ Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) toleranslıdır.
- ✿ Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek seviyede toleranslıdır.
- ✿ Kurağa karşı yüksek seviyede toleranslıdır.
- ✿ Orta erkenci bir çeşittir.
- ✿ Orta boylu ve sağlam gövdelidir.
- ✿ Ortasına kadar dane doldurabilen büyük tabla yapısına sahiptir.
- ✿ Tablası güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlayacak şekilde eğiktir.
- ✿ Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.



Boy (cm)

Kısa Boylu



Olum Süresi

Orta Erkenci



Yağ Oranı

Yüksek




LG 50.559 SX

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ✿ GRANSTAR® herbisitine uygun olarak geliştirilmiştir.
- ✿ Yüksek verimi ve çok yüksek yağ oranı sahiptir.
- ✿ Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) toleranslıdır.
- ✿ Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek seviyede toleranslıdır.
- ✿ Kurağa karşı yüksek seviyede toleranslıdır.
- ✿ Orta erkenci bir çeşittir.
- ✿ Orta boylu ve sağlam gövdelidir.
- ✿ Ortasına kadar dane doldurabilen büyük ve dışbükey tabla yapısına sahiptir.
- ✿ Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
- ✿ Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.



Boy (cm)

Orta Boylu



Olum Süresi

Orta Erkenci



Yağ Oranı

Yüksek




LG 50.559 SX

Hibrit Ayçiçeği Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ✿ GRANSTAR® herbisitine uygun olarak geliştirilmiştir.
- ✿ Yüksek verimi ve çok yüksek yağ oranı sahiptir.
- ✿ Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) toleranslıdır.
- ✿ Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek seviyede toleranslıdır.
- ✿ Kurağa karşı yüksek seviyede toleranslıdır.
- ✿ Orta erkenci bir çeşittir.
- ✿ Orta boylu ve sağlam gövdelidir.
- ✿ Ortasına kadar dane doldurabilen büyük ve dışbükey tabla yapısına sahiptir.
- ✿ Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
- ✿ Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.



Boy (cm)

Orta Boylu




Olum Süresi

Orta Erkenci



Yağ Oranı

Yüksek



KANOLA




LG CONSTRUCTOR CL

Hibrit Kanola Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- ☀ Clearfield teknolojisine uygun bir çeşittir.
- ☀ Yüksek tane verimi ve yağ orana sahiptir
- ☀ Doğal koşullarda Turnip Yellow Virus 'e (TuYV) karşı yüksek toleranslıdır. Kışa dayanımı iyi ve kurağa karşı yüksek toleranslıdır.
- ☀ Harnup çatlama direnci yüksektir.
- ☀ Kışlık kanola üretim alanlarına tavsiye edilmektedir.



Boy (cm)

Yüksek



Olum Süresi

Orta Erken



Yağ Oranı

Çok Yüksek



BÖLGE KOORDİNATÖRLERİ

İÇ ANADOLU BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	FATİH CENGİZ	0549 805 15 47
GAP BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	SALİH DEMİRCAN	0533 680 84 63
EGE BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	SEMİH TUTKAÇ	0533 460 26 10
ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	TARIK TAYYİPOĞLU	0533 381 26 06
KARADENİZ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	ONUR ARSLAN	0533 654 72 46
TRAKYA BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	CÜNEYT DENİZ	0549 725 47 21
GÜNEY MARMARA BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	ÖZGÜR AYDIN	0531 734 94 70

LGseedsturkiye



www.lgseeds.com.tr

Limagrain



Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. A.Ş.
Hüdavendigar Mh. Karaosmanlar Küme evleri No: 2/3/3
16700 Limagrain Sitesi Karacabey / BURSA



T: 0224 677 00 55
F: 0224 677 00 23



Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. A.Ş.
Hüdavendigar Mh. Karaosmanlar Küme evleri No: 2/3/3
16700 Limagrain Sitesi Karacabey / BURSA



T: 0224 677 00 55
F: 0224 677 00 23



www.lgseeds.com.tr



@lgseedstr