



KATALOG 2025



İÇİNDEKİLER

Limagrain Türkiye.....	2
Mısırın Morfolojisi.....	3
Mısır Tarımı.....	4
Toprak İşleme-Ekim.....	5
Gübreleme-Sulama.....	6
Hastalık ve Risk Yönetimi.....	7
Hydraneo.....	8
Animal Nutrition.....	9
LGAN Zaman Çizelgesi.....	10

ÇEŞİTLERİMİZ

Çeşit İsimleri				Sayfa
FAO 500-600	LG 31.515			14
	LG 30.500			15
	LG 31.555			16
	LG 31.545			17
FAO 600-700	HELEN			18
	LG 31.677			19
	LG 31.642			20
	LG 30.692			21
	LG 31.630			23
	INDACO			24
	LG 30.685			25
	LG 31.695			26
	LG 31.662			30
	TRUVA			28
FAO 700 +	LG 31.688			22
	LG 30.701			27
	LG 30.709			29



Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. A.Ş.

Fransa'da kurulu bulunan Limagrain Europe ve Türkiye'nin en büyük tarım satış kooperatiflerinden ikisi olan Trakya Birlik ve Karadeniz Birlik ortaklığıyla gücüne güç katmış olan Limagrain Tohum; sahibi ve hissedarlarının tamamı çiftçi olan Dünya'nın ilk ve tek tohumculuk firması olarak 40 yılı aşkın zamandır üreticilerimizin her zaman yanında onların desteğiyle daha nice başarılarla imza atmak üzere çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

Şirketimiz LG markası ile tarla bitkileri tohumluklarında hibrid ayçiçeği, hibrid mısır, kanola, buğday ve arpa tohumluklarının bitki ıslahı; ürün geliştirme, tohumluk üretimi, tohumlukların hazırlanması ve satışı konusunda tohumculuğun tüm aşamalarının tek bir şirkette toplanmış ülkemizde faaliyet gösteren ender firmalardan birisidir.

Limagrain Tohum; ülkemizde hibrid ayçiçeği ve mısır tohumluklarının satışında ilk sıralardadır. Avrupa buğdaygiller ve kanola pazarının en önemli lideridir.

Sadece yerel pazarda büyük bir oyuncu değil aynı zamanda yakın coğrafyaya da tohumluk ihracatı yaparak ülkemize döviz kazandırmaktadır. Ekim 2015 'te açılan Karacabey Tohumluk Hazırlama tesisimiz ile başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Fransa, İspanya, Kazakistan'a tohumluk ihracatı gerçekleştirmekteyiz. Kısacası bu ülkelerin ihtiyaçlarının büyük bir kısmı bu topraklarda geliştirilen ve üretilen tohumluklarla sağlanmaktadır.

Tohumculuk sektöründe ülkemize katkı sağlamak, bu konuda öncü olarak tarımla uğraşanları ve uğraşmak isteyenleri cesaretlendirmek arzusundayız.

Hedeflerimiz doğrultusunda özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza, iştiraklerimize, kooperatiflerimize, bayilerimize ve üreticilerimize, başarımızda emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Türkiye genelinde 7 bölgede, 100'den fazla çalışanı ile tarım sektöründe hizmet vermekteyiz.

MISIRIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ




Tepe Püskülü
(Erkek Organ)

Yaprak

Koçan Püskülü


Koçan
(Dişi Organ)



MISIR TARIMI

- Mısır kuvvetli bir saçak kök yapısına sahiptir.
- Toprağın 40-50 cm derinliğine kadar olan, tüm hacmindeki besin maddelerinden yararlanabilir.
- Toprağa yakın boğumlarından destek kökler çıkartır ve toprakla buluştuğunda hemen bitki besin maddelerinden yararlanır.
- Gövdesi yetiştirme şartlarına ve çeşide bağlı olarak 2,5-4 metre civarlarına kadar çıkabilmektedir.
- Her boğumdan bir yaprak çıkarır ve boyu 40-50 cm'e kadar çok kırılığandır.
- Daha sonra selülozik yapısı nedeniyle dayanıklılık kazanır.
- Genellikle 6. ve 7. yaprak koltuklarından koçan (dişi organ) oluşturur.
- Erkek ve dişi organ aynı bitkide olmasına rağmen yabancı döllenen bir bitkidir.

MISIR (ZEA MAYS)




- R2, R3 Süt olum dönemi
- R4 Sarı olum dönemi
- R5 Tam olum dönemi
- R6 Fizyolojik olum dönemi

GÜN	DÖNEM
0-25	Büyüme ve Gelişme
51-75	Çiçeklenme
76-100	Dane Dolumu
101<	Olgunlaşma

TOPRAK İŞLEME

- Sonbaharda 25-30 cm. derinliğinde sürüm yapılması önerilir.
- Toprakta uzun yıllar, aynı seviyede toprak işlenmesi yapılan tarlalarda meydana gelen pulluk tabanının (taban taşı), sonbaharda derin sürüm ya da dip kazan ile kırılması gerekir.
- Pulluk tabanının kırılması ile kök gelişiminin daha derinlemesine oluşması sağlanır.
- Bu sayede kökler daha fazla su ve besin elementinden faydalanılmış olur.



EKİM

BİTKİLER ARASINDA DÜZENLİ ÇIKIŞIN SAĞLANMASI


Daha düzenli çıkış ile

- Uygun bitki sıklığı
- Homojen çıkış

ÜRÜN GELİŞİMİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK

Standart bitkiler

- Her bitki için uygun fotosentez alanına sahip olması
- Mevcut suyun ve besin maddelerinin etkinliğinin artırılması
- Düzenli bitki kaplaması ile yapancı otların büyümesinin azaltılması
- Bitkilerin aynı anda olgunluğa ulaşmasının sağlanması




GÜBRELEME

- Toprak analizi yapılarak doğru gübreleme programı çıkartılmalıdır.
- Toprak yapısı ve Ph değeri bitkinin gübreyi kullanabilmesi için uygun ortamı belirlemektedir.
- Bu bilgilere göre yapılacak işlemler ile bitki gelişimini kontrol altında tutmak mümkün olabilmektedir.

TABAN GÜBRELEMESİNDE N,P,K İÇEREN KOMPOZE GÜBRELER KULLANIMADIR.

MAKRO BESİN ELEMENTLERİN GÜN SAYISINA GÖRE KULLANIMI;




0-25	Gün	%8	N	%9	P	%7	K
26-50	Gün	%35	N	%26	P	%44	K
51-75	Gün	%31	N	%35	P	%31	K
76-100	Gün	%20	N	%25	P	%14	K
101-<	Gün	%6	N	%5	P	%4	K

0-50 Gün :Büyüme ve Gelişme, 51-75Gün :Çiçeklenme, 76-100 Gün :Dane Dolumu, 101<Gün :Olgunlaşma

KRİTİK SULAMA SAFALARI

Sulama sayısı ve miktarı toprak yapısı, iklim koşulları gibi etmenlere göre değişiklik gösterirken, sulamada dönemi olarak 5 kritik dönem önemlidir.

- Bitki diz boyuna ulaşıncaya kadar ilk su ihtiyacının karşılanmış olması gerekir.
- Üst gübre uygulamasından hemen sonra suya girilmesi gereklidir.
- Tepe püskülleri çıkmadan önce sulamanın yapılması gereklidir.
- Tozlaşma başlagıcından sonuna kadar bitkinin su ihtiyacı sağlanmalıdır.
- Tane doldurma döneminde gerekli kuru maddenin aktarımı için su ihtiyacının karşılanması şarttır.



• FUSARIUM (*Fusarium spp.*)

- Toprak kökenli bir hastalıktır.
- Sap içerisinde görülen grimsi kahverengi lekeler bu hastalığın belirtileridir.
- Bitki herhangi bir nedenle strese maruz kaldığında etkisi daha hızlı ve zararı da daha fazla olur.
- Daneler enfekte olduğunda üzerlerinde pamuksu küfler oluşur.
- Kök ortadan boyuna kesildiğinde yayılan pis koku bu hastalığın belirtisidir.
- Hassas çeşitlerde, aşırı sıcaklar ve rutubet ile bitkinin bağışıklık sisteminin çökmesine neden olur.

**LIMAGRAIN ÇEŞİTLERİ
FUSARIUM'A KARŞI GENETİK
DAYANIMA SAHIPTİR.**



RİSK YÖNETİMİ

LIMAGRAIN DEĞİŞKEN ÇEVRE VE İKLİM ŞARTLARINA KARŞI, **GENETİK, TEKNOLOJİK VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER** SUNAR.

HYDRANEO
Tehnologie pentru gestionarea secetelor

GENETİK


Hızlı ve uniform çıkış ile
bir adım öndeyiz.

Kuraklık stresine üst
düzey dayanım sağlar

starcover
active

**TOHUM
KAPLAMA**

Güçlü köklenme ve
biyokimyasal dayanıklılık



**ISLAH
TEKNOLOJİSİ**

Yüksek lif sindirilebilirliği ve enerjisi sayesinde
süt ve et veriminde artış

agrility

**DİJİTAL
TARIM**

Tarlanızın tüm gelişim aşamalarını anlık
izlemenizi destekliyoruz.

HYDRANEO[®]

KURAKLIK YÖNETİM TEKNOLOJİSİ

HYDRONEO KARAKTERİZASYONUNA SAHİP ÇEŞİTLERİM İSTİKRARLI VERİMLERİ İLE ÇİFTÇİLERİMİZİ ASLA STRESE SOKMAZ!

HYDRANEO hibritleri, diğer hibritlere göre, suyu 4-5 gün daha uzun süre bekleyebilme özelliğine sahiptir. Bir sonraki sulamada, su stresine girmesini ve dolayısıyla standard gelişimi üzerindeki olumsuz etkiyi iptal eder. Bu nedenle HYDRANEO, özellikle kurak ve sıcak yıllarda bile daha fazla üretim ve verim stabilitesi anlamına gelir.



KÖKLERİN DAHA BÜYÜK EMİCİ YÜZEY ALANI

Dolaşımdaki çözeltide su kullanabilen daha fazla kök kılcal damarı.



GELİŞTİRİLMİŞ YÜKSEK STOMA AYARI

Yüksek sıcaklıklar ve yüksek yaprak terlemesi nedeniyle stres koşullarında önler.



POTANSİYEL SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI

Verimlilik: Kullanılan litre su başına daha fazla kuru madde üretilir.



HOMOJEN ÇİÇEKLENME VE DÖLLENME

Daha iyi gübreleme ve artan polen canlılığı




BİTKİ DETOKSİFİKASYONA BAŞLAMASI

Vegetatif gelişimin yavaşlaması ve uyku modu

İNEKLER ASLA YALAN SÖYLEMEZ



OMD SEVİYESİ : 0,70



SİNDİRİLEBİLİRLİK GERÇEK YARAYIŞLI OLAN MİKTAR DEMEKTİR.

OMD (ORGANİK MADDE SİNDİRİLEBİLİRLİĞİ)= ALINAN TOPLAM MİKTAR- ATIK MADDE MİKTARI



LGAN ZAMAN ÇİZELGESİ

HAYVANSAL ÜRETİMİ DESTEKLEYEN 25 YILLIK DENEYİM

1997 YILINDA LIMAGRAIN. Hayvan beslenmesi alanında büyük bir inavasyon sundu. LGAN Programı, yüksek lif ve protein sindirilebilirliği, enerji verimliliği ile üretimimize değer katar.

AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ RESMİ KURUMLARLA YAPILAN TESTLER İLE SÜT SIĞIRI/GÜN BAŞINA ORTALAMA SÜT ARTIŞI + 1,2 LT.

6 ÜLKEDE TELABORATUAR TESTLERİYLE DESTEKLENDİ.

AVRUPA'DAKİ PARTNER ENSTİTÜLERİMİZ



INRAE



Schothorst Feed Research

EILYPS
CONSEIL / EXPERTISE / ÉLEVAGE



2016



2011



1997



2005



2012



2017



2020

2021



LG Türkiye olarak taşınabilir NIR cihazımız LGLAB ile, silolarınızdan alınan numunelerin sonuçlarını anlık olarak öğrenebiliyoruz. Uzman çalışanlarımız ile işletmelerinize gelerek, teknik desteğimizi sunuyoruz.



ÇEŞİTLERİMİZ



YENİ



LG 31.545

LG 31.545



LG 31.555

LG 31.555



LG 31.515

LG 31.515



LG 30.500

LG 30.500



LG 30.597

LG 30.597

FAO 500-600 DANELİK ÇEŞİTLER

FAO 500-600 DANE+SİLAJLIK ÇEŞİTLER



LG 30.692

LG 30.692



LG 31.642

LG 31.642



LG 31.677

LG 31.677



LG 31.688

LG 31.688



HELEN

HELEN

FAO 600-700 DANELİK ÇEŞİTLER



LG 30.709

LG 30.709



TRUVA

TRUVA



31.662

31.662



LG 31.630

LG 31.630



LG 30.701

LG 30.701



LG 30.685

LG 30.685



LG 31.695

LG 31.695



INDACO

INDACO

FAO 600-700 SİLAJLIK ÇEŞİTLER

FAO 600-700 DANE+SİLAJLIK ÇEŞİTLER




LG 31.515


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Çok erkenci olum grubunda danelik bir çeşittir.
- Erkenci grupta olmasına rağmen yüksek verim potansiyeline sahiptir.
- Hektolitresi çok yüksek; danesi camsı ve kırmızı renklidir.
- Sap ve koçan çürüklüğü (Fusarium Spp.) hastalıklarına yüksek toleranslıdır.
- Hızlı nem atma (Dry Down) özelliği üst düzey bir üründür.
- Hasatta yeşil kalma (Stay Green) özelliğine sahiptir. Sağlam kök ve gövde yapısı sayesinde yatma ve yıkılmaya karşı dayanıklıdır.
- Çeşidin doğal koşullara uyumu ve adaptasyon kabiliyeti yüksektir.



Dane Kriterleri



Boy
2,7m - 3m
orta



Koçan Boyu
40-42



Çevre Sayısı
18-20



TWK
330-350




LG 30.500


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- FAO 500 olgunluk grubunda yer alan erkenci mix bir çeşittir.
- Özellikle 2. Ürün silajlık verimi üst düzey ve yüksek kaliteli silaj değerlerine sahiptir.
- Hızlı büyüme ve gelişme potansiyeli sayesinde maximum silaj verimine ulaşır.
- Sürme gücü yüksek olduğundan hızlı çıkış sağlar.
- Yüksek hektolitreye ağırlığı ve iri koçanı sayesinde, verim potansiyeli çok yüksek bir çeşittir.
- Sağlam gövde ve kök sistemi sayesinde, her türlü toprakta ekimi yapılabilir.
- Dane rengi kırmızı, TWK'sı (Hektolitreye) yüksek ve nem atması hızlıdır.
- En önemli özelliği olan Hydraneo (su stresine yüksek dayanım) sayesinde rakiplerinden her zaman bir adım öndedir.



Dane Kriterleri



Boy
2,5m - 3m
orta



Koçan Boyu
38-42




Çevre Sayısı
14-16



TWK
280-300

Silaj Kriterleri






LG 31.555


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Orta erkenci olum grubunda yer alan hem dane ,hem silaj verimi üst düzey bir çeşittir.
- Hızlı nem atma özelliği (Dry Down) bulunur.
- Sap çürüklüğü ve Koçan çürüklüğü (Fusarium spp.)'ne yüksek toleranslıdır.
- Güçlü bitki, bol ve geniş yapraklı ve iri koçan yapısıyla hem silaj hem dane verim potansiyeli çok yüksektir.
- Hasatta yeşil kalma (Stay Green) özelliğine sahiptir.
- Yüksek hektolitre ağırlığına ve gösterişli koçana sahiptir.
- Toprak seçiciliği olmayan ve stress koşullarına yüksek toleranslıdır.
- Özellikle 2. Ürün yüksek silajlık verimi ve kalitesi ile ön plana çıkmaktadır.



Dane Kriterleri




Boy
3m - 3,4m
uzun



Koçan Boyu
38-42

Silaj Kriterleri



Çevre Sayısı
16



TWK
300-320





LG 31.545


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Orta erkenci olum grubunda yer alan danelik bir çeşittir.
- Yaprak yanıklığına (*Helminthosporium turticum*) yüksek toleranslıdır.
- Sap çürüklüğü ve Koçan çürüklüğü (*Fusarium spp.*)'ne yüksek toleranslıdır.
- Koçan rengi kırmızı, ince at dişi dane yapısına sahiptir.
- Dik yapraklı, sık ekime uygun ve kuvvetli kök sistemine sahiptir.
- Stres koşullarına dayanımı yüksek ve koçan ucu doldurma özelliği üst düzey bir çeşittir.
- Toprak seçiciliği olmayan ve adaptasyonu çok yüksek bir çeşittir.
- İç Anadolu bölgesinde 1. Ürün danelik, diğer bölgelerde ikinci ürün olarak ekilebilir.



Dane Kriterleri



Boy
2,6m - 3m
orta



Koçan Boyu
38-42



Çevre Sayısı
16



TWK
300-330




HELEN


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- FAO 650 grubu danelik bir çeşittir.
- Güçlü kök ve sağlam gövde sistemi sayesinde yatmaya çok dayanıklıdır.
- Yüksek sıcaklıklara karşı toleransı yüksektir, bu özelliği sayesinde özellikle GAP bölgesindeki çiftçilerin büyük beğenisini kazanmıştır.
- Helminthosporium Spp. ve Fusarium Spp. hastalıklarına karşı yüksek toleranslıdır.
- Hızlı nem atma kabiliyetine sahiptir. (Dry Down)
- Yüksek hektolitreye ağırlığı ve iri koçanı sayesinde, verim potansiyeli çok yüksek bir çeşittir



Dane Kriterleri



Boy
3m - 3,5m
orta



Koçan Boyu
38-42



Çevre Sayısı
16-18



TWK
320-340




LG 31.677


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Orta-geççi olum grubunda yer alan danelik bir çeşittir.
- Dik yapraklı, sık ekime uygun ve standart koçan yapma özelliğine sahiptir.
- Güçlü bitki ve sap dayanıklılığı ile yatma ve yıkılmaya üstün mukavemet gösterir.
- Çok hızlı nem atma kabiliyeti (Dry Down) sayesinde hasatta hızlı gelir.
- Yüksek hektolitre ağırlığı ve at dişi dane yapısı ile dane verimi potansiyeli çok yüksek bir çeşittir.
- Yüksek sıcaklı ve kuraklık stresine karşı dayanıklıdır.



Dane Kriterleri



Boy
3,6m - 3,8m
orta



Koçan Boyu
38-42



Çevre Sayısı
16



TWK
330-350




LG 31.642


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Orta-geççi olgunluk grubunda yer alan danelik bir çeşittir.
- Güçlü kök sistemi ve sağlam gövdesi sayesinde yatmaya çok dayanıklıdır.
- Yüksek hektolitreye ağırlığı ve iri koçanı sayesinde, verim potansiyeli çok yüksek bir çeşittir.
- Stay Green özelliği sayesinde, hasatta sağlıklı bitki görüntüsünü korur.
- Helminthosporium Spp. ve Fusarium Spp. hastalıklarına karşı yüksek toleranslıdır.
- Hızlı nem atma kabiliyetine sahiptir. (Dry Down)
- Güçlü adaptasyon özelliği ile stres koşullarına çok dayanıklıdır.



Dane Kriterleri



Boy
3,5m - 3,8m
orta



Koçan Boyu
40-44



Çevre Sayısı
16-18



TWK
320-340




LG 30.692


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- FAO 690 grubu danelik bir çeşittir.
- Dik yapraklı, koçan rengi kırmızı ve sık ekime uygun bir çeşittir.
- Yüksek hektolitreye ağırlığı ve iri koçanı sayesinde, verim potansiyeli çok yüksek bir çeşittir.
- Helminthosporium Spp. ve Fusarium Spp. hastalıklarına karşı yüksek toleranslıdır.
- Sıcaklık ve abiyotik stres koşullarına dayanımı sayesinde koçanlarda uç boşluğu görülmez.
- Stay Green özelliği sayesinde, hasatta yeşil kalarak, sağlıklı bitki görüntüsünü korur.
- Zayıf toprak koşullarında dahi yüksek adaptasyon ve verim potansiyeline sahiptir.



Dane Kriterleri



Boy
3,6m - 3,8m
orta



Koçan Boyu
40-44



Çevre Sayısı
16-18



TWK
330-350




LG 31.688


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- FAO 700 grubu danelik bir çeşittir.
- Dik yapraklı, kuvvetli kök sistemi ile sık ekime uygun bir çeşittir.
- Çevre sayısı ve hektolitre ağırlığı yüksek olması sayesinde mükemmel verim potansiyeli gösterir.
- Helminthosporium Spp. ve Fusarium Spp. hastalıklarına karşı yüksek toleranslıdır.
- Çok hızlı nem atma özelliği (Dry Down) sebebiyle, hasata uygun zamanda gelir.
- Stay Green özelliği sayesinde, hasatta yeşil kalarak, sağlıklı bitki görüntüsünü korur.
- Kuraklık (Drought) ve diğer çevresel stres koşullarına üstün dayanım gösterir.



Dane Kriterleri



Boy
3,6m - 3,8m
uzun



Koçan Boyu
40-44



Çevre Sayısı
18



TWK
340-350





LG 31.630


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Orta geççi olgunluk grubunda yer alan hem dane hem silaj verimi yüksek bir çeşittir.
- Güçlü kök sistemi ve sağlam gövdesi sayesinde yatmaya çok dayanıklıdır.
- Güçlü bitki, bol ve geniş yapraklı ve iri koçan yapısıyla hem silaj hem dane verim potansiyeli çok yüksektir.
- Helminthosporium Spp. ve Fusarium Spp. hastalıklarına karşı yüksek toleranslıdır.
- Hasada yeşil kalma özelliği yüksektir. (Stay Green)
- Silaj yapım zamanı bitkinin alt yaprakları ve gövdesi yeşil kalma özelliğine sahiptir.
- Yüksek hektolitre ağırlığı ve iri koçanı sayesinde, verim potansiyeli çok yüksek bir çeşittir



Dane Kriterleri




Boy
3m - 3,5m
orta



Koçan Boyu
42-44

Silaj Kriterleri



Çevre Sayısı
16-18



TWK
320-350




INDACO


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Orta geççi olgunluk grubunda yer alan mix bir çeşittir.
- Uzun boylu bitki yapısı ve gösterişli koçanı ile hem dane hem silaj verimi üst düzeydedir.
- Yüksek hektolitreye ağırlığı sayesinde, dane verim potansiyeli üst düzeydedir.
- Bölgesel olarak değişmekle birlikte 1. ve 2. Ürün silajlık ekimine uygundur.
- Sağlam gövde, bol yapraklı ve iri koçan yapısıyla verim potansiyeli çok yüksektir.
- Silaj yapım zamanı bitkinin alt yaprakları ve gövdesi yeşil kalma özelliğine sahiptir.
- Çevresel stres koşullarına dayanımı sayesinde adaptasyonu yüksektir.




Dane Kriterleri



Boy
3,6m - 4m
uzun

Koçan Boyu
42-46

Silaj Kriterleri



Çevre Sayısı
16-18

TWK
320-340



LG 30.685


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER


- Orta geççi olgunluk grubunda yer alan mix bir çeşittir.
- Dane ve silaj verimi üst düzey bir çeşittir.
- Uzun boylu, bol yapraklı ve güçlü kök sistemine sahiptir.
- Hasada kadar sağlıklı ve yeşil kalma özelliği yüksektir. (Stay Green)
- Yüksek lif sindirilebilirliği sayesinde silaj kalite değerleri üst düzeydedir.
- Çevresel stres koşullarına dayanımı sayesinde adaptasyonu yüksektir.
- Hızlı nem atma (Dry Down) kabiliyetine sahiptir.
- Üstün döl tutma kabiliyeti ve üniform koçan yapısına sahiptir.



Dane Kriterleri



Silaj Kriterleri



Boy
3,7m - 4m
uzun



Koçan Boyu
42-44



Çevre Sayısı
16-18



TWK
300-320




LG 31.695


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER


- Orta geççi olgunluk grubunda yer alan mix bir çeşittir.
- Sıcaklık ve abiyotik stres koşullarına dayanımı sayesinde uç boşluğu görülmez.
- Stay Green özelliği sayesinde, hasatta yeşil kalarak, sağlıklı bitki görüntüsünü korur.
- Sağlam gövde, bol yapraklı ve iri koçan yapısıyla hem silaj hem dane verim potansiyeli çok yüksektir.
- Kuru madde ve sindirim değerleri ile hayvan beslemenize yüksek katkı sunar.
- Helminthosporium Spp. ve Fusarium Spp. hastalıklarına karşı yüksek toleranslıdır.
- Kuraklık ve sıcaklık stresine (Drought) üstün dayanım gösterir.



Dane Kriterleri



Silaj Kriterleri



Boy
3,6m - 3,8m
uzun



Koçan Boyu
38-42



Çevre Sayısı
14-16



TWK
330-350




LG 30.701


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER


- FAO 700 grubu bir çeşittir.
- Dane ve silaj verimi üst düzey bir çeşittir.
- Uzun boylu ve güçlü kök sistemine sahiptir.
- Hasada kadar sağlıklı ve yeşil kalma özelliği yüksektir. (Stay Green)
- Stres koşullarına adaptasyonu çok iyidir.
- Yüksek hektolitre ağırlığı sayesinde, verim potansiyeli çok yüksek bir çeşittir.
- Helminthosporium ve Fusarium hastalıklarına karşı yüksek toleranslıdır.
- Dik yapraklı bir çeşit olduğundan sık ekime uygundur.



Dane Kriterleri



Silaj Kriterleri



Boy
3,4m - 3,8m
uzun



Koçan Boyu
42-44



Çevre Sayısı
16-18



TWK
320-340



TRUVA


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Ortalama 100 günlük silajlık bir çeşittir. (FAO 650)
- Sağlam gövde, bol yapraklı ve iri koçan yapısıyla verim potansiyeli çok yüksektir.
- Düşük lignin oranı ve yüksek lif sindirilebilirliği sayesinde süs verimine önemli katkı sağlar.
- Kuru madde oranları ve besin değerleri çok yüksektir.
- Silaj yapım zamanı bitkinin alt yaprakları ve gövdesi yeşil kalma özelliğine sahiptir.
- Bölgesel olarak değişmekle birlikte 1. ve 2. Ürün ekimine uygundur.
- Güçlü adaptasyon özelliği ile stres koşullarına çok dayanıklıdır.



Silaj Kriterleri



Boy
3,8m - 4,2m
uzun



Koçan Boyu
46-48



Çevre Sayısı
16



TWK
300-320



LG 30.709


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- 100-110 günlük silajlık bir çeşittir.
- Sağlam gövde, bol yapraklı ve iri koçan yapısıyla verim potansiyeli çok yüksektir.
- Düşük lignin oranı ve yüksek lif sindirilebilirliği sayesinde süs verimine önemli katkı sağlar.
- Selüloz oranının düşük olması hayvanda hazmin yüksek olmasını sağlar.
- Kuru madde oranları ve besin değerleri çok yüksektir.
- Güçlü adaptasyon özelliği ile stres koşullarına çok dayanıklıdır.



Silaj Kriterleri



Boy
3,8m-4,2m
orta



Koçan Boyu
46-48



Çevre Sayısı
16-18



TWK
300-320



LG 31.662


Hibrit Mısır Tohumu

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

- Silajlık olarak olgunlaşma süresi, iklimsel duruma bağlı olarak ortalama 95-110 gündür.
- Üst düzey silajlık verime ve yüksek silaj kalite değerlerine sahiptir.
- Silaj olgunluğuna geldiğinde yeşil kalma(Staygreen) özelliğine sahiptir.
- Toprak seçiciliği yoktur, her toprakta ekimi yapılabilir.
- Silajlık olarak; yüksek nişasta oranı ve yüksek lif sindirilebilirliği sayesinde süt verimi ve süt yağı yükselir.
- Silajda yaprak ve dane oranı yüksekliği ile hayvan beslenmesine katkıyı artırır.
- Çeşidin doğal koşullara uyumu ve adaptasyon kabiliyeti yüksektir.



Silaj Kriterleri



Boy
3,6m - 4m
uzun



Koçan Boyu
44-46



Çevre Sayısı
18-20



TWK
330-350

LG TOHUM AYÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİ

GRANSTAR® (SX)



LG 50.559 SX



LG 50.689 SX



LG 50.489 SX



LG 50.580 CLP

YENİ!

CLP



LG 50.501 CLP



LG 50.521 CLP



LG 50.550 CLP



LG 50.635 CLP



LG 50.455 CLP

OR



LG 50.585



LG 50.621

YENİ!



TUNCA



LG 50.480



LG 5485

OR-X

OR7



BÖLGE KOORDİNATÖRLERİ

İÇ ANADOLU BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	FATİH CENGİZ	0549 805 15 47
GAP BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	ERSİN US	0533 680 84 62
EGE BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	SEMİH TUTKAÇ	0533 460 26 10
ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	TARIK TAYYİPOĞLU	0533 381 26 06
KARADENİZ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	ONUR ARSLAN	0533 654 72 46
TRAKYA BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	CÜNEYT DENİZ	0549 725 47 21
GÜNEY MARMARA BÖLGE KOORDİNATÖRÜ	ÖZGÜR AYDIN	0531 734 94 70

LGseedsturkiye



www.lgseeds.com.tr

Limagrain



Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. A.Ş.
Hüdavendigar Mh. Karaosmanlar Küme evleri No: 2/3/3
16700 Limagrain Sitesi Karacabey / BURSA



T: 0224 677 00 55
F: 0224 677 00 23